

Manual de Instruções

Cansema Salve

Por favor, leia cuidadosamente antes de usar!

A definição médica de "cura" é não re-ocorrência da patologia no prazo de cinco anos após o tratamento. Pela mesma definição utilizada pela medicina ortodoxa, o Creme Cansema ® é cientificamente comprovado para a cura do cancer da pele para a maioria daqueles que usam o produto de acordo com nossas instruções.



ATENÇÃO: Por favor, leia as instruções a seguir com atenção antes de aplicar Cansema. Não, de forma alguma, se desvie do seguinte. Se você tiver dúvidas depois de uma leitura minuciosa, envie um email para qualquer esclarecimento. Lembre-se, Cansema irá fornecer resultados apenas se você tem cancer de pele, ao contrário a um crescimento benigno. Isso inclui os carcinomas basocelulares e espinocelulares e melanomas da pele.

Para obter informações sobre uma alternativa para as toupeiras benignas e verrugas, consulte conosco sobre o creme Bloodroot Paste.

1. Preparação

Primeiro, como dito anteriormente, o usuário pode querer ter uma biópsia ou outro procedimento de diagnóstico realizado para verificar se existe ou não, de fato, cancer de pele.

Muitas pessoas, na observação de que eles têm um "mole" ou uma marcação de pele semelhante que está crescendo e ficando mais escura, optaram pela utilização de Cansema de qualquer maneira. Afinal, Cansema é seletiva na sua ação e só "vai atrás" de tecido canceroso neoplásico.

Tecido saudável só irá avermelhar e tornar-se ligeiramente irritado quando Cansema é aplicado. Esta decisão é inteiramente a critério do usuário, não há perigo, ou perigos tóxicos em aplicar Cansema ao tecido saudável, apesar de fazer isso é simplesmente um desperdício do produto. Além disso, se você tiver atacando mais de um crescimento, fazer um de cada vez.



Preparando o Cansema ® Salve: Poucos salves escuróticos, e Cansema ® não é uma exceção, usam agentes emulsificantes, então de modo a obter os melhores resultados com o Cansema ®, você deve passar alguns segundos misturando o conteúdo antes de aplicar.

Para os recipientes mais pequenos (22 g), isto pode ser feito com um palito, para a jarra de tamanho maior (102 g), encontramos a melhor solução a ser um palito de sorvete. Com uma agitação rápida e rigorosa, você vai notar que a aparência e consistência do produto irá mudar de uma aparência preta macia na superfície, a um creme liso verde escuro. E esta textura produz os melhores resultados.

2. Aplicação

O Cansema tem a consistência de uma massa grossa, úmida. Pode facilmente ser auto-aplicado com os dedos e deve ser espalhado sobre a lesão ou tecido

canceroso em uma cobertura fina, quase levemente "endurecida". Lave bem as mãos antes e após a aplicação do Cansema.

A área de aplicação vai começar a formigar, pouco depois, em média entre 5 minutos a 6 horas após a aplicação inicial. Na verdade, se você não sentir "nada" depois de 3 a 6 horas, é mais provável que nada mais vai acontecer, isso significa que o Cansema não conseguiu entrar em contato direto com o cancer. Após 24 horas, você deve remover o Cansema e repetir a aplicação, repetindo este processo, até que o Cansema consiga chegar e "agarrar" o crescimento aberrante subjacente.

Em alguns casos de lesões maiores, há uma sensação de queimação, por isso é importante ter ibuprofen, ou outros medicamentos para a dor sem prescrição, disponível durante o processo. Áreas maiores do que um centímetro quadrado pode exigir a analgésicos mais fortes, que sendo prescrição, irá requerer os serviços de um médico cooperativo. Caso contrário, observando-se um bom "controle da dor" pode exigir que o cancer seja "tirado em etapas."

Isso envolve a aplicação de uma pequena quantia para a borda do crescimento, esperando que as sensações diminuam quando o processo de cicatrização começa, e depois repetindo esse processo em uma área adjacente da pele até que toda a área tenha sido coberta. Observar esse mesmo procedimento se você está direcionando mais de um crescimento. Faça um de cada vez. Desta forma, qualquer desconforto é minimizado porque todo o processo, o que pode nesse caso durar vários dias, foi distribuído ao longo do tempo.

Isto vale a pena repetir: Nunca aplicar Cansema a uma área grande, a menos que esteja sobre os cuidados e aconselhamento de um médico.

Também é uma boa idéia colocar um curativo (bandagem) sobre a área, especialmente se a formação da crosta de ferida está em um lugar no corpo que pode ser sujeito a ser colidido ou machucado no curso da atividade diária. Outra coisa a considerar é que o Cansema pode manchar roupas, por esta razão e questões de higiene, cobrir a área é uma boa idéia.



Eu apliquei Cansema e a ferida não formou crosta! O que eu faço agora?

Cansema tem que entrar em contato com a área do cancer a fim de funcionar. Possui propriedades transdérmicas, ou seja, capacidade de penetração na pele, uma característica que é reforçada com o Cansema - Deep Tissue, bem como as nossas versões veterinárias. No entanto, alguns truques simples também podem acelerar o processo e/ou reduzir o número de aplicações necessárias para "atingir" um cancer de pele que está bastante abaixo da epiderme. A maioria das pessoas não precisam destas técnicas se o cancer de pele está perto da superfície da pele. Recomendamos que estes "truques" abaixo só sejam utilizados se a aplicação inicial não produz resultados, o que acontece apenas com uma minoria dos casos.

A. Lavagem Profunda com escova Loufah: Muitas pessoas usam uma esponja loufah para *lavar rigorosamente* e preparar a pele antes de aplicar Cansema Salve. Isso serve para remover algumas das células mortas da camada mais superficial da epiderme (o estrato córneo), de modo o Cansema tem menos pele para atravessar para chegar ao cancer subjacente.

Loufah = A parte seca e fibrosa do fruto de uma planta do gênero *Luffa*, usada como uma esponja ou coador.

B. Furos de Agulha: Esta técnica é mais eficaz, mas mais invasiva. Envolve tomar uma agulha esterilizada e cuidadosamente fazer furos na pele - cerca de 1/6 à 1/8 polegadas profundos, assim como um acupunturista faria - exceto que a agulha é removida logo após os e os furos são geralmente espaçados cerca de 1/4 de polegada distantes. Após a criação dos "buracos na pele", Cansema Salve é então re-aplicado. Recomendamos que esta técnica seja utilizada por profissionais e não pacientes. Aconselhamos também que os profissionais preparem a área, esfregando três gotas de Lugol a pele recém "picada" antes do Cansema ser re-aplicado, a não ser que o paciente seja diabético, uma contra-indicação clara. Neste caso o peróxido de hidrogênio (3-6 %) atuará como um substituto adequado.



3. Gerenciando a Cicatriz

Após 24 horas, retirar a bandagem. Usando o peróxido de hidrogênio (H₂O₂ - 3%, disponível na maioria das farmácias) e um cotonete, muito levemente passar por cima da lesão, removendo qualquer excesso de Cansema e detritos orgânicos (ou seja, pus, líquido seroso, etc).

Se uma formação pus completa não é evidente ou está incompleta, repita o passo 2 e deixar o novo aplicativo em um adicional de 24 horas antes de

prosseguir. Normalmente uma aplicação é suficiente para tumores pequenos (do tamanho de uma borracha de lápis), mas não mais de três aplicações são necessárias para tumores maiores.

Há casos, porém, quando aplicações repetidas de Cansema são necessárias por causa dos problemas de "acessibilidade" - embora isso possa ser evitado usando as técnicas citadas na seção anterior. A fim de dar início ao processo de cicatrização, entretanto, e começar a matar o cancer, é fundamental que Cansema seja capaz de penetrar e chegar ao local do problema. Isso pode levar múltiplas aplicações, 3 ou mais, embora 1-2 aplicações é mais comum.



Depois a ferida já formou a crosta, mantê-la bem protegida. Você pode adicionar a vitamina E, **QuikHeal Green**, ou **H3O** (diluído com água purificada na proporção 64:1) para acelerar a cura - mas sei que isso é melhor usar quando chegar a fase de cicatrização. Embora nos relatórios mais recentes apresentados, H3O foi utilizado durante todo o processo como um agente de limpeza, agindo para acelerar a cura e minimizar a cicatriz.



Normalmente o curativo pode ser deixado por um prazo de 10 dias, no entanto, em casos avançados, há uma considerável "drenagem", isto é, uma emissão constante de pus.

No sentido de que o Cansema mata as células cancerosas e toma certos leucócitos (glóbulos brancos de defesa) com ele no processo de eliminar a neoplasia, ele é um agente supurativo, isto é, a drenagem não deve ser vista como anormal. A faixa possível de reações é entre muito pouco pus, e apenas

um curativo é necessário, e uma troca regular de curativos, apenas necessária no caso de melanomas avançados. Seu caso será em algum lugar no meio.

4. Removendo a Crosta



A crosta em si representa a morte da neoplasia, e isto ocorre logo após a aplicação. Tudo o que se segue a partir daí são respostas reparadoras do próprio corpo. De agora em diante, o corpo sabe exatamente o que fazer e não perde tempo fazendo isso. No entanto, os próximos dias e semanas que se seguem parecem longos.

A próxima etapa é a remoção da crosta de ferida, ou sarna. Isso geralmente acontece dentro de **10 dias após a aplicação inicial**, a não ser que o cancer seja muito avançado ou cobre uma grande área do corpo. Como acontece com qualquer sarna, deixá-la cair quando ela estiver pronta. Não puxe-a prematuramente, embora ela acabará anexada a um pequeno segmento de tecido de pele que pode ser facilmente separado com segurança.

Se você remover a sarna prematura, é ainda maior o risco de desenvolvimento de tecido cicatricial.

5. A Cicatrização

Após a crosta sair, a ferida pode parecer crua e sem graça. No entanto, se mantida coberta todos os dias e os princípios de uma boa higiene sejam seguidos, não haverá risco de infecção secundária.

Se você trabalha em uma área que não é muito limpa, no entanto, você pode ter o peróxido de hidrogênio acessível (disponível em qualquer farmácia) ou H₂O₂, e aplicá-lo livremente para o local 1x por dia para matar todas as bactérias invasivas. Outra opção é o uso de QuikHeal Verde, uma pomada tópica que acelera o processo de cicatrização e, ao contrário de H₂O₂ ou peróxido de hidrogênio, tem uma viscosidade mais grossa que lhe permite permanecer na pele por mais tempo.

Durante um período de alguns meses ou, em alguns casos 2 anos, toda a área será curada com apenas alguma despigmentação ou cicatriz. O resultado é raramente mais feio ou inestético que se a cirurgia tivesse sido escolhida em lugar do Cansema.

Na maioria dos casos o cancer "não volta" para a área aplicada, a não ser se houver metástase subjacente. No entanto, para ter certeza que a área está livre do cancer, muitos usuários optam por iniciar uma 2a ou mesmo 3a aplicação depois de chegar a fase curativa. Tomamos uma perspectiva pessimista a isto, pois o risco de cicatrizes aumenta com cada nova re-aplicação. No entanto, com formas particularmente agressivas de cancer, como o melanoma, o usuário pode querer pesar as vantagens potenciais de re-aplicação, especialmente se o cancer inicial está localizado em algum lugar do corpo que normalmente não é esteticamente sensível, ou visto em público, como nas costas, coxa, etc.

Nada disto deveria ser tomado como um substituto para a utilização de alguns dos melhores testes marcadores de cancer que estão agora disponíveis a partir de médicos licenciados qualificados. Em outras palavras, se você não precisa mais de uma aplicação, por que fazê-la. Em outras palavras, uma vez que o **Cansema** terminou o seu trabalho, normalmente, não há células residuais do tumor original. Esta regra encontra mais exceções quanto maior o crescimento do cancer original foi, quanto mais profundo sobre a pele, quantos mais casos de cancer da pele o sujeito teve, e/ou quanto mais extensa a história de uma pessoa com cancer de pele é ou foi.

Lembre-se, pode ser necessário repetir esse processo, se o cancer de pele é suficientemente amplo, de modo que as células cancerosas residuais foram deixadas para trás depois de terminar o seu primeiro ciclo. (Embora, essa advertência existiria mesmo se você teve seu cancer de pele removido cirurgicamente.)

Como garantia, tenha o seu profissional de saúde verificar a área para ver se há algum cancer remanescente. Existem testes excelentes de marcador de antigénio que o seu médico pode utilizar para determinar se você está agora finalmente curado e saudável.

Traduções por www.CurasdoCancer.com