

Orientações para o uso do Poly-MVA



Poly-MVA é seguro. Testes extensos, tanto em laboratório quanto em clínicas ao longo dos últimos **dez anos**, tem provado isso. *Não existe um nível conhecido do Poly-MVA, acima do qual irá ocorrer toxicidade.* Poly-MVA não prejudica as células normais - mesmo aquelas que se dividem rapidamente. Poly-MVA *hidrata e energiza as células normais*, enquanto *normalizando ou matando células anormais.*

Nos últimos anos, os médicos dos Estados Unidos e de 8 países estrangeiros, tem administrado Poly-MVA para os seus pacientes. Desta sabedoria coletiva com base na experiência clínica que essas orientações atualizadas para o uso de Poly-MVA foram compiladas.

Protocolo, Dosagens e Número de Garrafas Necessárias por Mês:

Cada garrafa de 236 mL de Poly-MVA contém 48 colheres de chá.

Cada colher de chá é aprox. 5 mL.

As doses são peso-dependente, aumentando à medida que o peso aumenta o peso. Para o tratamento da doença, (doses terapêuticas), use sob a supervisão de um médico e/ou um médico alternativo qualificado licenciado.

Tome Poly-MVA, com o estômago vazio, pelo menos **30 minutos antes das refeições** ou **duas horas depois de comer alimentos sólidos**. Se o paciente tiver dificuldade com o sabor do Poly-MVA, **pode ser tomado com suco**, como amora, uva, ameixa ou de vegetais.

Use instrumentos de medição ou colheres de **plástico, vidro ou cerâmica** e não de metal. Dispositivos e colheres de metal podem afetar o sabor do Poly-MVA.

Tome a sua quantidade diária de Poly-MVA **em doses divididas** se possível. Por exemplo, 2 colheres de chá, 4 vezes ao dia - três vezes antes das refeições e uma vez antes de dormir. Se você está tomando uma colher de chá ou menos por dia você pode tomar tudo de uma vez. Se você tem conflitos insolúveis de agenda que impedem a dividir a sua dose diária, tome tudo de uma vez.

As orientações abaixo são sugestões gerais porque o corpo de cada um é diferente.

O uso recomendado não só pode variar em casos especiais, devido à massa corporal, tamanho e saúde física, mas também devido a outros fatores, tais como a capacidade do indivíduo de absorver ou utilizar o produto. Por essa razão, nós descobrimos que algumas pessoas tem conseguido os resultados desejados, permanecendo na dosagem de "apoio máximo" por períodos de tempo maiores dos que os sugeridos aqui.

Por favor, não hesite em nos contactar com quaisquer dúvidas ou preocupações que você possa ter.

Se você é um profissional usando Poly-MVA na sua prática ou com ou seus clientes e precisa de mais ajuda, favor contatar a equipe CurasdoCancer.com pelo nosso site.

Para Apoio Nutricional Diário, Prevenção da Doença ou como um Tônico de Longevidade:

1/4 a 2 colheres de chá por dia, dependendo do peso corporal. Uma garrafa pequena de 118mL, então, dura entre 7 e 14 semanas.

Adultos com Fases Iniciais de Desequilíbrios Físicos:

Dose inicial:

Dia 1: 1 colher de chá (1 colher de chá)

Dia 2: 2 colheres de chá (1 colher de chá, 2 vezes).

Dia 3: 4 colheres de chá (1 colher de chá, 4 vezes).

Dias 4-30: 8 colheres de chá (2 colheres de chá, 4 vezes).

Em seguida reduza a 4 colheres de chá diariamente, (2 colheres de chá, duas vezes ao dia), até que os resultados desejados sejam alcançados. Para a manutenção de um novo sistema equilibrado e apoio contínuo, tomar 1-2 colheres de chá diariamente.

Adultos com Doenças em Estágio Inicial:

Dose inicial: 8 colheres de chá diariamente em doses divididas, 2 colheres de chá, 4 vezes ao dia, durante uma semana.

Em seguida reduza a 4 colheres de chá diariamente, 2 colheres duas vezes ao dia, até que os resultados desejados sejam alcançados.

Para a manutenção da remissão, 1-2 colheres de chá diariamente. Cerca de *oito garrafas* são necessárias para os primeiros três meses.

Adultos com Doenças em Estágio Final:

8 colheres de chá diariamente em doses divididas - 2 colheres de chá, 4 vezes ao dia por *pelo menos dois meses*. Embora o rótulo da garrafa indique uma dose "padrão", os médicos e pacientes relataram resultados melhores com uma dosagem de 8 de colheres de chá por dia por pelo menos dois meses.

Depois disso, consulte o seu médico e/ou um médico alternativo qualificado licenciado sobre a possibilidade de redução da dosagem. Dez garrafas são necessárias para os primeiros dois meses.

Atenção: Se você é um adulto em remissão de uma doença grave, e só agora estão começando a usar Poly-MVA, você é aconselhado a acompanhar o Protocolo de Estágio Inicial, começando com 8 colheres de chá por dia. **NÃO** começar com a "dose de manutenção".

Uso Adulto de Apoio Máximo:

Dose inicial:

Dia 1: 2 colheres (1 colher de chá, duas vezes)

Dia 2: 4 colheres de chá (1 colher de chá, quatro vezes).

Dias 3-Avante: 8-12 colheres de chá (2 colheres de chá, 4-6 vezes.)

Continue com 8-12 colheres de chá por dia por um período mínimo de 3 meses. Recomendamos em seguida consultar com o seu médico ou terapeuta, para comentários adicionais para que você possa reduzir para uma dose de manutenção adequada até que os resultados desejados sejam alcançados. Cinco (5) garrafas por mês são necessárias tomando 8 colheres de chá por dia.

Atenção: Se você é um adulto em processo de superação de um desafio de saúde grave e que está apenas começando a usar Poly-MVA, recomendamos que você siga os usos sugeridos para adultos nos estágios iniciais de desequilíbrio físico, começando com 1 colher de chá, em seguida, 2 colheres de chá por dia, em seguida 4 colheres de chá 4, em seguida 8 colheres de chá. Nós sugerimos que você não comece com uma "Dosagem de Manutenção". Maior apoio normalmente é necessário neste momento pois muitos dos sistemas do corpo têm frequentemente sido fortemente comprometidos.

Para qualquer dúvida entre em contato conosco.

Crianças com Estágios Iniciais de Desequilíbrios Físicos:

1 colher de chá para cada 18 quilos de peso corporal por dia. Sugerimos que você comece dando a criança uma pequena quantidade e aumente a esta quantidade lentamente ao longo de 3 ou 4 dias. Continue até que os resultados desejados sejam alcançados, em seguida, diminua a dosagem se desejado.

Crianças que Necessitam de Apoio Máximo:

1 colher de chá para cada 9 quilos de peso corporal por dia. Sugerimos que você comece dando a criança uma pequena quantidade e aumente a esta quantidade lentamente ao longo de 3 ou 4 dias. Continue com esta dosagem por pelo menos 2 meses ou mais até que os resultados desejados sejam alcançados, em seguida, diminua a dosagem se desejado.

Crianças com Doenças em Estágio Final:

1 colher de chá por dia por cada 9 quilos de peso corporal, por pelo menos dois meses antes de reduzir a dose. Depois disso, consultar o médico da criança e/ou terapeuta médico alternativo qualificado licenciado sobre a possibilidade de redução da dosagem.

Para Eficácia Máxima - Como e Quando tomar Poly-MVA:

Pesquisas mostram benefício em tomar Poly-MVA e Co-Q10 ao mesmo tempo. Ao fazer isso sugerimos tomar eles com alimentos, pois alimentos aumentam a absorção de Co-Q10. Qualquer horário que seja bom para você está ótimo, o produto será absorvido. Se sentir desconforto do estômago tomar com leite ou comida. Para melhorar o sabor, Poly-MVA pode ser misturado com água, chá, café, ou suco (como amora, uva, ameixa ou vegetal).

Nota: Use instrumentos de medição e colheres de plástico, vidro ou cerâmica, e não as de metal, o metal pode afetar o sabor do Poly-MVA.

Toma a quantidade diária de Poly-MVA em doses divididas, se possível. Por exemplo, 2 colheres de chá, 4 vezes ao dia – três vezes antes das refeições e uma vez antes de dormir. Se tomando uma colher de chá apenas por dia ou menos, é bom tomar tudo de uma vez se as circunstâncias não permitem dividir a dose. Se tomando CoQ10 recomendamos tomá-los juntos.

Tomando Poly-MVA com Antioxidantes, Quelantes, Fibra, e Esteróides:

Anti-oxidantes e produtos de desintoxicação nas suas doses diárias recomendadas podem ser tomadas no prazo de 30 minutos após a ingestão de Poly-MVA. Se você estiver tomando **doses elevadas de antioxidantes**, como por exemplo 1-5 gramas de Vitamina C diariamente, recomendamos **esperar 6 horas** antes de tomar Poly-MVA. Se estiver tomando mega doses de vitamina C, 5-150 gramas por dia, consulte o seu médico. O ácido alfa-lipóico por si só também deve ser minimizado.

Notas: O uso do antioxidante **Co-enzima Q-10 (Co-Q-10)** foi demonstrado em laboratório a trabalhar em sinergia com Poly-MVA. Portanto, a recomendação seria de 400-600 mg por dia da forma padrão de CoQ10, ou 120 mg por dia do "Q-Gel", ou 30-45 gotas de LiQsorb que tem se mostrado mais absorvível do que todas as outras formas de CoQ10. Pesquisas mostram benefício em tomar a Poly-MVA e Co-Q10 ao mesmo tempo. Ao fazer isso sugerimos tomar eles com alimentos, pois alimentos aumentam a absorção de Co-Q10.

Os produtos do tabaco, álcool e consumo excessivo de cafeína também podem diminuir a absorção de Poly-MVA. **Graviola, sulfato de hidrazina e Pau D'Arco** podem interferir com a absorção de Poly-MVA, por isso recomendamos alternar esses produtos em dias diferentes. **As Zeólitas** podem quelar o paládio mineral portanto não são recomendáveis quando se tomando Poly-MVA.

Se usando terapias de quelação intravenosa ou quelação oral, suplementos que são projetados para remover metais pesados ou placa

arterial do corpo, sugerimos deixar um intervalo de pelo menos 24 horas entre usá-los e Poly-MVA, como os quelantes podem minimizar a eficácia do Poly-MVA. Portanto, recomendamos tomar quelantes e Poly-MVA em dias alternados.

Se estiver usando um produto de fibra, tais como cascas de sementes de psyllium, sementes de linhaça moídas, ou farelos, deixar um intervalo de pelo menos uma hora entre toma-lo e tomar Poly-MVA ou qualquer outro suplemento ou agente farmacêutico, para garantir que seus suplementos e medicamentos podem ser adequadamente absorvidos. **Fibra tende a absorver os suplementos**, e pode também movê-los através do trato digestivo muito rapidamente e assim não permitindo uma absorção máxima a ocorrer.

A utilização moderada a forte de esteróides podem, em alguns casos, diminuir a eficácia do Poly-MVA. Não há nenhuma maneira de definir qual quantidade de qualquer esteróide é muita, devido as muitas variáveis. Se você está tomando esteróides, você deve estar sob a supervisão de um médico.

Reações que Podem Ocorrer em Casos Raros:

1. Uma reação de limpeza também referida como a "Resposta Herxheimer " ou "Reação de Desintoxicação" pode ser causada pela introdução de apoio nutricional auxiliando os sistemas do corpo muito rapidamente. Recomendamos a redução da dosagem ou quantidade de uso até que a situação se auto-normalize, geralmente dentro de alguns dias. Condições podem incluir, mas não estão limitadas a: erupção cutânea, dor de cabeça, odores incomuns ou fortes odores corporais, evacuações frequentes, fadiga leve ou náuseas. Uma reação de limpeza pode indicar que o corpo está facilmente absorvendo e respondendo aos nutrientes vitais.
2. Poly-MVA, por vezes, pode atuar como um agente de contraste paramagnético criando um efeito de halo em alguns exames de ressonância magnética, mas apenas após grandes doses, geralmente

durante um período mínimo de 4 meses. Poli-MVA é um complexo que contém minerais que podem vibrar em determinadas circunstâncias, quando expostos à radiação paramagnética. Isso geralmente é raro, mas para obter informações adicionais, ou para responder a quaisquer dúvidas, contate-nos para falar com um consultor.

Armazenamento e Validade:

Não é necessário refrigerar Poly-MVA, mas você pode, se desejar. Não exponha Poly-MVA à luz solar direta, pois esta exposição pode afetar o sabor. A exposição ao calor moderado não é um problema. Melhor se utilizado até à data no frasco.

*** As sugestões de uso contidas não são oferecidas ou destinadas a tratar, prevenir ou mitigar qualquer doença. Por favor, consulte um profissional de saúde qualificado, de preferência, mas não necessariamente um familiarizado com Poly-MVA, se você tiver algum problema de saúde.**